




Ingezet wordt op het vergroten van de biodiversiteit en de beleving van het groen door de seizoenen heen. Hiervoor worden op plekken waar woekerende soorten zijn verwijderd, soorten toegevoegd die bijdragen aan nest- en schuilgelegenheid, voedselvoorziening (vruchten) en het aantrekken van insecten (bloeiwijzen).

Daarnaast leveren deze soorten een gevarieerd beeld op in de beleving van de seizoenen voor de bewoners en bezoekers van de groenstrook (sierwaarde bloemen, vruchten).

Gekozen is voor de soorten die door de gemeente zijn voorgesteld. Deze bieden voldoende variatie in beeld en dragen goed bij aan de biodiversiteit.

-  Cornus mas
-  Viburnum lantana
-  Ilex aquifolium
-  Cotoneaster salicifolius
-  Lonicera tatarica 'Honeyrose'



**Viburnum lantana:**

- Inheems
- Bloeitijd mei-juni
- Waardplant vlinders
- Vruchten vogels



**Cornus mas:**

- Inheems
- Bloeitijd jan-mrt
- Vruchten
- Drachtplant (hommels, bijen)
- Vormt dicht struweel (nestgelegenheid)



**Lonicera tatarica 'Honeyrose':**

- Uitheems
- Bloeitijd in juni- juli
- Vruchten
- Drachtplant (hommels, vlinders)



**Ilex aquifolium:**

- Inheems
- Wintergroen
- Bloeitijd mei-juni
- Vruchten
- Drachtplant (bijen, vlinders, hommels)



**Cotoneaster salicifolius:**

- Uitheems
- Wintergroen
- Bloeitijd mei-juni
- Vruchten
- Drachtplant (bijen)